اللؤلؤ الهرموني في تدبير النزف الرحمي الوظيفي حول سن اليأس

الدكتور تمام حبيب*

تاريخ الإيداع 10 / 8 / 2014. قُبِلَ للنشر في 11 / 12 / 2014)

□ ملخص □

شملت الدراسة 85 مريضة أعمارهن بين 40 - 48 سنة اشتهين من النزف الرحمي الوظيفي الذي تظاهر بزيادة مدة الطمث وغازته، أو من غزارة الطمث أو من المشككتين معاً في آن واحد، وقسمت المريضات إلى:

مجموعة A (N=50) : أعطيت المريضة Norethisterone فمويًا 5ملغ / 3 مرات / اليوم لمدة 6 أشهر

مجموعة B (N=35) : تم تركيب للمريضات لؤلؤ هرموني داخل الرحم (Mirena) والمتابعة سنة .

■ إن التأثير الجانبي الأكثر شيوعاً في المجموعة A هو الانزعاج من تناول اليومي للدواء ثلاث مرات يومياً ولمدة طويلة (70%) في حين في المجموعة B هو الألم الختلي وأسفل الظهر (28,85%) .

■ الاضطراب لإيقاف العلاج في المجموعة A شكلت نسبة (16%) بينما المجموعة B (5.7%) .

■ تحسن الخضاب أكثر في المجموعة B منه في المجموعة A .

■ نسبة نجاح العلاج في المجموعة A كانت (76%) بينما في المجموعة B هي (88.35%) .

■ الاضطراب لاستئصال الرحم كانت المجموعة A (22%) من الحالات ، بينما في B (8.55%) .

الكلمات المفتاحية : النزف الرحمي الوظيفي _ غزارة الطمث _ لؤلؤ هرموني داخل الرحم _ استئصال الرحم.

*عضو هيئة فنية (مشرف على الأعمال) في قسم التوليد وأمراض النساء - كلية الطب - جامعة تشرين - اللاذقية.

Intra Uterine System for management of Dysfunctional Uterine Bleeding Pre-menopause

Dr. Tamam habib*

(Received 10 / 8 / 2014. Accepted 11 / 12 / 2014)

□ ABSTRACT □

The study comprised 85 patients between 40-48 years old ,those have complained of DUB as either menorrhagia ,hyper menorrhea or both, the study was divided to :

Group A(50 patients): were given Norethisterone orally 5mg*3/daily for 6 months.

Group B (35 patients):whose IUS was inserted for them and followed up for 1 year.

-The commonest side effect in GA was discomfort from taking the medicine 3times daily for long times (70%)while in GB was lower abdominal pain and low back pain(28,85%).

-The necessity to discontinue the treatment in GA was (61%)while in GB was(5,7%).-

-The improvement in Hemoglobin concentrate was better in GB than GA .-

-The successful of treatment was(76%)in GA while(88,35%) in GB .-

-The total abdominal hysterectomy rate was(22%) in GA while in GB(8,55%) .

Key words: Dysfunctional Uterine Bleeding(D.U.B)- menorrhagia- Intra Uterine System(I.U.S)- hysterectomy .

* Work supervisor , Department of gynecology-obstetrics ,Faculty of medicine, University of Tishreen, Lattakia ,Syria

مقدمة:

النزف الرحمي الوظيفي (**Dysfunctional Uterine Bleeding D.U.B**) [المرجع 1][2] هو ظهور النزف الرحمي غير مرتبط بالموجودات غير الطبيعية للرحم ويطانته يشخص باستبعاد [مرجع رقم 1]: أ- الأسباب العضوية للرحم : (ورم ليفي - الأندومتريوز - الأدينوميوز - بوليبيات بطن الرحم - فرط تصنيع بطانة الرحم ...)

ب- الأمراض الطبية المزمنة : قصور الدرق - مبيض متعدد الكيات (P.C.O.S)

ج- الحمل واختلاطاته .

د- الأدوية المؤثرة على تخثر الدم (مميعات الدم -...)

D.U.B يمكن أن يحدث خلال السنوات الخمس الأولى من البلوغ (20% من الحالات) وما حول سن اليأس (50%) حيث أن السبب الرئيسي لل D.U.B هو اللابلاضة مما يؤدي إلى اضطراب التوازن الهرموني وبالتالي حدوث D.U.B .

العلامات المميزة لل D.U.B : [المرجع 1][2]

هي النزف خارج أوقات الدورة الطمثية ويمكن أن يحدث مع الدورة الطمثية : غزارة الطمث - نزف طمثي مديد أكثر من 7 أيام - نزف طمثي غزير ومديد - النزف الطمثي يحدث في أقل من 21 يوماً من الدورة الأخيرة (تقارب طموث).

ملاحظة: الدورة الطمثية الطبيعية مدتها 21 - 35 يوماً مدة الطمث 2-7 أيام كميته 30-80 مل /خلال الدورة وسطياً 35 مل .

كيف تشخص D.U.B ؟ [المرجع 1][2]

1 (الاستجواب والقصة المرضية : حيث أن الاستجواب عن الدورة الطمثية وانتظامها وكمية النزف والأدوية المستخدمة من قبل المريضة مثل (حبوب منع الحمل - مميغات من الدم ...) يمكن أن يعطي فكرة عن D.U.B)
2 (التصوير بالأموح فوق الصوتية (الإيكو) هذا الإجراء يسمح بنفي أو تأكيد موجودات غير طبيعية مثل البوليبيات- الأورام للبنية الرحمية- كيسات الأندومتريوزيه - مبيض متعدد الكيسات - الحمل واختلاطاته - فرط تصنيع بطانة الرحم

3 (فحوص مخبرية : وتشمل [المرجع 1][2]

- خضاب وهيماتوكريت لكشف مقدار فقر الدم .
- تحاليل هرمونية LH- FSH - TSH - FT4 من أجل قصور الدرق والمبيض المتعدد الكيسات .
- وظائف الكبد والكلية وزمن النزف والتخثر .

4 (خزعة باطن الرحم : [3]

إن سماكة البطانة الرحمية تقاس بواسطة الايكوغرافي المهبلي عبرمقطع طولي للرحم. حيث البطانة الرحمية الطبيعية في مرحلة ما حول سن اليأس تختلف في السماكة (الثخانة) وفقاً للدورة الطمثية من 4 ملم في الطور الجريبي إلى 14 ملم في الطور اللوتيني لذلك : إذا أظهر الإيكو المهبلي سماكة في البطانة الرحمية أكثر أو يساوي 14 ملم وكانت المريضة فوق سن الأربعين (ماحول سن اليأس) فإنه يجب إجراء خزعة باطن الرحم وأحياناً إجراء توسيع

وتجريف (D + C) وذلك لنفي أو تأكيد فرط تصنع بطانة الرحم وحتى سرطان بطانة الرحم خاصة إذا كان لدى المريضة عوامل خطورة لحدوث سرطان بطانة رحم مثل : بدانة ، سكري

كيف نعالج D.U.B : بشكل عام [3]

1-دوائياً : حبوب منع الحمل - بروحسترون - مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية - ميفامنيك أسيد ..

2-اللولب الهرموني : حيث يوضع ضمن الرحم ويفرز الليفونورجستريل .

3-البالون الحراري

4-جراحياً: فشل العلاجات السابقة نجري كشط للبطانة أو استئصال الرحم.

1-دوائياً : [3]

في حالات الهجمات الحادة من النزف اللااباضي نعطي حبوب منع الحمل يجب أن يتوقف خلال 14- 24 ساعة ولمنع تكرار النزف يجب إعطاء حبوب منع الحمل المختلطة بشكل دوري لمدة 3 أشهر . ممكن إعطاء البروجسترون مثل Norethisterone (15 ملغ / يومياً) أو مبدروكسي بروجسترون اسيتات (بروفيرا) 5 - 10 ملغ / يومياً و قد تصل إلى 40 ملغ / يومياً فمويًا ولمدة 10-14 يومياً من كل شهر .

ويمكن إعطاء البروجسترون من اليوم 5 للدورة ولمدة عشرين يوماً متتالياً .

■ في حالات النزف الحاد غير الإباضي يمكن إعطاء الأستروجين 25 ملغ / وريدياً كل 4 ساعات حتى

يتوقف النزف أو يخف وإعطاء البروجسترون فوراً أو بعد 3 أيام من إعطاء الاستروجين ويعد الانتهاء من الدواء

نزف السحب سوف يحدث وهؤلاء المريضات يجب أن تعالج بحبوب منع الحمل لمدة 3 أشهر (3 دورات شهرية) .

■ يمكن استخدام مضادات الالتهاب غيرالستيروئيدية مثل:

النابروكسين Naproxine - بروفين Profen - الايبوبروفين Ibuprofen ...

حيث تقلل من كمية النزف ألطمثي الغزير بشكل ملحوظ ويجب أن ننصح المريضة بأخذ هذه الأدوية قبل

1- 2 يوم من موعد الدورة الطمثية المتوقع .

■ البعض يستخدم الأدوية المضادة للنزف أو ما تسمى المرقنات مثل Epsilon Amino carbohic Acid

المعروف تجارياً(Caperol) 2-4 غ/اليوم لمدة 3-5 أيام خلال النزف ألطمثي حيث تعتبر هذه الطريقة كخط علاجي مساعد في الحالات الشديدة.

ملاحظة : يجب دعم المريضات بمركبات الحديد وذلك لمدة 3- 6 أشهر مع مراقبة الخضاب .

2- اللولب الهرموني : [4] [5]

إن اللولب الهرموني (Mirena) يشبه اللولب النحاسي من حيث الشكل كما هو موضح في الشكل رقم (1) حيث

يحتوي في الذراع العمودي على خزان يحتوي على 52 ملغ من الليفونورجستريل (Levonorgestril) حيث طوله

الكلي يعادل 32 ملم والذراع T (T-Shaped) مصنع البلاستيك المشرب بالبار يوم وبالتالي يصبح اللولب ظاهراً

على الأشعة × وكذلك على الإيكو غرافي وللولب خيطان اثنان متصلان إلى قاعدة اللولب بشكل عروة أو عقدة وهذان

الخيطان يساعدان عند الرغبة في نزع اللولب كما هو موضح في الشكل رقم (1) .

هذا اللولب يسمح بشكل ثابت إطلاق وتحرير 20 ميكروغرام / يومياً (عند بداية تركيبه) من الليفونورجستريل

في حين بعد 5 سنوات من وضع اللولب فإنه يحرر 11 ميكروغرام / اليوم .

شكل رقم (1)

تركيب اللولب : [6]

يجب تركيب اللولب من قبل طبيب ذو خبرة جيدة حيث أن اللولب الهرموني هو أكثر عرضاً من اللولب النحاسي
(NOVA T380) مثل لولب نوبا (*Intra Uterine Device I.U.D*)

حيث أن اللولب الهرموني Mirena يقيس 4,5 ملم في أنبوب الإدخال لذلك قد نضطر في بعض الحالات إلى توسيع عنق الرحم كما عند الخروسات Nulliparous أو بعض النساء حول سن اليأس Pre-menopause. حيث أن النجاح في وضع اللولب في المكان المناسب من جوف الرحم هام من أجل أن يضمن ويكفل لتعرض منتظم لبطانة الرحم إلى هرمون الليفونورجستريل وهذا يحسن فعالية اللولب.

■ يوضع اللولب عادة خلال الأيام السبعة الأولى من الطمث ويفضل تجنب الأيام التي يكون فيها النزف غزيراً لأن هذا ممكن أن يزيد من احتمالية طرده كما هو موضح في الشكل رقم (2)[7].

■ يوضع اللولب الهرموني بعد الإجهاض العفوي أو المحرض مباشرة بدون أن يزيد من التأثيرات الجانبية له بينما بعد الولادة يوضع بعد مرور 6 أسابيع من الولادة .

■ إن اللولب الهرموني يطلق الليفونورجستريل بشكل موضعي ضمن جوف الرحم والامتصاص أجهازي يتم بواسطة شبكة الأوعية الشعرية من الطبقة القاعدة لبطانة الرحم وهذا الامتصاص يؤدي إلى مستوى بلازمي ثابت 0.4 - 0.6 نانومول / ليتر الشكل رقم (3)[7] .

■ وهذا المستوى ينحدر بشكل تدريجي مع تقدم الزمن ولكن المستوى البلازمي للليفونورجستريل يبقى حتى 72 شهراً.

شكل رقم (3)

إن الأعراض البيروجسترونية غالباً عابرة مثل ألم في الثديين - احتباس سوائل - نرفزة - ألم معدي-...
نزع اللولب:

يمكن نزع اللولب بسهولة وذلك عن طريق سحب خيطا اللولب بالملقط (FORCEPS) ويفضل سحبه خلال فترة الطمث حيث يكون أسهل و إذا كانت المريضة في سن النشاط التناسلي يفضل الامتناع عن الجماع قبل أسبوع من إزالته و ذلك لمنع حدوث الحمل.

شكل رقم (2)

مضادات الاستطباب: [8]

الحمل - نزف مهبل غير معروف السبب - الداء الحوضي الالتهابي
انتانات الرحم بعد الولادة - إنتان المهبل وعنق الرحم - لطاخة بابا نيكولا الشاذة - سرطان الثدي - سرطان الرحم
وعنق الرحم - أمراض الكبد والكلى .

الاختلاطات : [8]

■ انطراح اللولب لذلك على المريضة مراجعة طبيبها خلال بضعة أسابيع من تركيبه وكل 6 أشهر ويجب أن تتعلم المريضة الكشف عن اللولب ولمس خيطانه بعد كل دورة طمثية .

- تشكل كيسة جرابية وفي 98% من الحالات تتراجع هذه الكيسات عفويا .
- زيادة حدوث الداء الحوضي الالتهابي (**P.I.D** .**Pelvic .Inflammatory .Disease**).
- زيادة حدوث الأمراض المنتقلة بالجنس .
- التمشيح الدموي (ويسمى أحيانا بالتقيح (spotting)) : مثله مثل اللولب النحاسي وخاصة خلال 2-3 أشهر الأولى من تركيبه .

الاستطابات:

- كمانع حمل وذلك بإحداث ضمور في بطانة الرحم وزيادة سماكة مخاط عنق الرحم وبشغله الحيز ضمن جوف الرحم ومنع التعشيش..

- في علاج النزف الرحمي الشاذ **Abnormal Uterine Bleeding A.U.B** والنزف الرحمي الوظيفي

D.U.B

- قرط تصنع بطانة الرحم **Hyperplasia**.
- المبيض المتعدد الكيسات (**P.C.O.S**) **poly Cystic Ovary Syndrome** .

أهمية البحث وأهدافه :

تكمُن أهمية البحث في شيوع حالات النزف الرحمي الوظيفي **D.U.B** (حيث يشكل 10-15 % من الحالات المراجعة للعيادات النسائية) الذي يؤدي إلى علاجات دوائية عديدة ذات آثار جانبية متنوعة أو علاجات جراحية مثل استئصال الرحم كحل لمشكلة النزف وبالتالي تأتي أهمية البحث في إيجاد وسيلة جيدة وممكنة وتقلل الآثار الجانبية وتقلل الحاجة للعمل الجراحي لعلاج النساء في بلدنا اللواتي يعانين من **D.U.B** ويهدف البحث في معرفة دور اللولب الهرموني (**Mirena**) في تدبير **D.U.B** (الذي يتظاهر بالنزف أطمثي الغزير أو المديد أو كليهما) وذلك عند النساء حول سن اليأس (الضهي) وذلك لتشجيع الأطباء والمريضات على استخدامه وتقبله في بلدنا كخط لعلاج **D.U.B**

طرائق البحث ومواده:

لقد تمت دراستنا خلال 12 شهراً في مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية- قسم النسائية والتوليد- وذلك من تاريخ 2012/3/1 ولغاية 2013/3/1 حيث تم انتقاء مريضات ماحول سن اليأس **Pre-Menopause** (40 - 48 سنة) ويشنكين من نزف رحمي وظيفي يتظاهر بزيادة مدة الطمث وغزارته، أو من غزارة الطمث أو من المشكلتين معاً في آن واحد.

وقد تم استبعاد كل المريضات اللواتي تبين من خلال التقييم وجود آفة عضوية مسببة للنزف الرحمي الشاذ (**A.U.B**). مثل { ورم ليفي رحمي - قرحة عنق الرحم - بوليبيات باطن الرحم وبوليبيات عنق الرحم - الأندومتريوز - مبيض متعدد الكيسات - تناول أدوية (مميعات) - فرط تصنع بطانة الرحم }، فكان بذلك عدد عينة الدراسة 85 مريضة تم تقسيمهن إلى مجموعتين :

A: (عددها 50) أعطيت المريضة النورايثيدرون (**Norethisterone**) فمويماً 5ملغ /3مرات/ اليوم لمدة 6 دورات.

B : (عددها 35) حيث تم تركيب لولب هرموني داخل الرحم (**Mirena**) والمتابعة سنة .

لقد استخدمنا في المجموعة A حبوب الديرهوسترون (**Norcolute**) **Norethisterone** /5 ملغ/3مرات/اليوم .

لقد استخدمنا في المجموعة B لولب هرموني (Mirena) حيث تم تركيبه في مشفى الأسد الجامعي في العيادة الخارجية للمشفى بعد الحصول على الموافقة الخطية للمريضة وبعد التأكد من عدم وجود مضاد استقلاب لتطبيق هذا النوع من العلاج .

ولقد درسنا مايلي :

- 1- الآثار الجانبية للمعالجة في كلتا المجموعتين .
- 2- دراسة الاضطراب لإيقاف العلاج (عدم تناول الدواء فموياً أو سحب اللولب) .
- 3- معايرة الخضاب والهيما توكريت للمريضات في كلتا المجموعتين وذلك قبل بدء العلاج وبعد 3-6 أشهر وفي المجموعة B بعد سنة .
- 4- دراسة نجاح العلاج .
- 5- دراسة الاضطراب للعمل الجراحي (استئصال الرحم) في كلتا المجموعتين .
- 6- دراسة مقارنة مع دراسات محلية وعالمية .

النتائج والمناقشة :

1- لقد درست الآثار الجانبية التي ظهرت على مريضات الدراسة في كلتا المجموعتين A + B حيث إن المريضة قد تكون اشكتت من تأثير جانبي واحد أو عدة آثار جانبية والجدول رقم (1) يوضح ذلك :

الجدول رقم (1)

الانزعاج من تناول الدواء اليومي	انتفاخ الثديين	ألم في الثديين	الم ختلي وأسفل الظهر	نرفزة	الم معدي	صداع	
35=70%	7=14%	5=10%	4=8%	3=6%	12=24%	4=8%	N=50 A
0%	2=5.7%	1=2.85%	10=28.85%	1=2.85%	1=2.85%	1=2.85%	N =3 B
6.46	1.23	1.27	2.56	0.68	2.66	0.99	Z
** 0.000	n 0.109 .s	0.102 n.s	0.00523 **	0.25 n.s	**0.00319	n.s0.16	P

- * : يوجد فرق معنوي باحتمال 95% .
- ** : يوجد فرق معنوي باحتمال 99% .
- n.s : لا يوجد فرق معنوي .

نلاحظ من الجدول أن التأثير الجانبي الأكثر حدوثاً في المجموعة هو الانزعاج من تناول الدواء اليومي (70%) (ثم يليه الألم المعدي (24%) و كان الألم وأسفل الظهر التأثير الجانبي الأكثر حدوثاً في المجموعة B (28.8%)

2) دراسة الاضطراب لإيقاف العلاج :

لقد اضطررنا خلال متابعة الدراسة والعلاج إلى إيقاف أخذ الدواء فموياً (المجموعة A) عند 8 مريضات (نسبة 16%) وذلك لظهور تأثير جانبي أو عدة تأثيرات عند المريضة نفسها في حين اضطررنا لسحب اللولب الهرموني بعد تركيبه خلال سنة من المتابعة بعد استمرار النزف والتمشيح والألم الختلي عند مريضين وبشكل نسبة قدرها (5.7%). والجدول رقم (2) يوضح الأسباب الأكثر شيوعاً لإيقاف العلاج .

الجدول رقم (2)

الاضطرار لإيقاف العلاج بسبب	الانزعاج من تناول الدواء اليومي	الم معدني	الم خثلي وأسفل الظهر	استمرار النزف والتمشيع
مجموعة A N=8=16%	5	4	-----	6
مجموعة B N=2=5.7%	-----	-----	2	2

3 (معايرة الخضاب والهيما توكريت :

ملاحظة هامة :

في خطة قسم النسائية في مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية لمريضات **D.U.B** بعد دراسة المريضة بشكل كامل (ايكوجرافي للرحم والملحقات ودراسة مخبريه وفحص نسائي و إجراء تنظيف عنق رحم مكبر ثم تجري تجريف رحم استقصائي ونرسل العينات للتشريح المرضي) ففي حال سلبية الموجودات وخاصة التشريح المرضي نعطي المريضة كعلاج للنزف الرحمي معالجة بروجسترون 3-6 أشهر ففي حال فشل العلاج تجري استئصال رحم باستطباب نزف رحمي شاذ غير مستجيب للعلاج الدوائي لذلك في دراستي اعتمدت في المجموعة **A** على مدة 6 دورات شهرية بالإضافة كذلك وجدت في المراجع التي اعتمدها في دراستي في تدبير ال **D.U.B** تعتمد فترة 3-6 أشهر .

أما في المجموعة **B** فاعتمدت مدة السنة كمتابعة لان اللولب الهرموني من أثاره الجانبية التمشيع الدموي خلال الثلاث الأشهر الأولى كما أن الدراسات والمراجع تعتمد مدة السنة كحد أدنى في تدبير **D.U.B** ما لم تظهر آثار جانبية تجبر علي نزع اللولب ويفضل أن تكون المتابعة أكثر من سنة .

كما انه ممكن في المستقبل إن تجري دراسة تعتمد أن تكون متابعة المجموعة **A** مدة سنة والمجموعة **B** أكثر من سنة (سنتين أو ثلاث سنوات) .

لقد أجري لمريضات الدراسة معايرة الخضاب والهيما توكريت في مخبر المشفى وذلك قبل بدء العلاج وبعد مضي 3 أشهر و6 أشهر من العلاج في كلتا المجموعتين إضافة إلى بعد سنة في المجموعة **B** والجدول (3) يوضح مقدار الخضاب في كلتا المجموعتين .

الجدول رقم (3)

متوسط تركيز خضاب الدم غ/د.ل	قبل العلاج	بعد 3 أشهر	بعد 6 أشهر	بعد سنة
مجموعة (A)	10.2 ± 1.1	11.6 ± 1.3	11.7 ± 1.2	-----
مجموعة (B)	10.3 ± 1.1	11.5 ± 1.4	11.9 ± 1.4	12 ± 1.3
Z	0.42	0.34	0.69	-----
P	0.34	0.37	0.25	-----

نلاحظ من الجدول رقم (3) أن الخضاب تحسن بعد أخذ العلاج المقترح في كلتا المجموعتين وذلك بعد 3 و6 أشهر من العلاج ولكن لم يكن هناك فارق معنوي بين المجموعتين خلال الستة أشهر من العلاج ويعود سبب ذلك إن اللولب قد يسبب تمشيح دموي خلال الأشهر الأولى من تركيبه لذلك الخضاب في المجموعة B لم يتحسن بشكل معنوي واضح عما هو في المجموعة A .

4) دراسة نجاح العلاج :

لقد اعتبرنا نجاح العلاج يتحقق في تخلص المريضة من النزف الرحمي بحيث تكون كمية الدم أقل من 80 مل. لقد وجدنا أن نسب النجاح متباينة في كلتا المجموعتين .

الجدول رقم (4)

بعد سنة	بعد 6 أشهر	بعد 3 أشهر	نسبة نجاح العلاج
-----	38=N (76%)	34=N (68%)	مجموعة (A)
	27 =N (79.8%)	20 =N (57%)	مجموعة (B)
	1.4	1.036	Z
	0.034 *	n.s 0.15	P

نلاحظ من الجدول رقم (4) أن مريضات المجموعة A كانت نسبة نجاح العلاج مرتفعة أكثر من المجموعة B وذلك بعد 3 أشهر من العلاج حيث بلغت (68%) بينما في المجموعة B (57%) ولكن لا يوجد فرق معنوي حيث P = (0.15 n.s) ويعود ذلك بسبب حدوث التمشيح والتبقيع Spotting عند مريضات اللولب بشكل أعلى خلال 3 أشهر الأولى من تركيبه .

في حين نلاحظ أن نسبة النجاح في المجموعة B بعد 6 أشهر من تركيب اللولب كانت أعلى من المجموعة A حيث بلغت (79.8%) حيث يوجد فارق معنوي بنسبة 95% حيث P = (0.034 *).

ونلاحظ أيضا أن نسبة النجاح في المجموعة B ترتفع بشكل ملحوظ وذلك بعد سنة من تركيب اللولب الهرموني حيث بلغت نسبة النجاح (88.35%) وهذه النسبة ممتازة حيث تخلصت 88.35% من المريضات D.U.B واللواتي تم تركيب لهن اللولب الهرموني من النزف الشاذ وبدون اللجوء إلى إجراء طبي أو جراحي آخر .

والخلاصة من الجدول رقم (4) أن : نجاح العلاج بالتخلص من النزف الرحمي الوظيفي D.U.B يكون واضحا في المجموعة B أكثر من المجموعة A وذلك بعد ستة أشهر من تركيب اللولب الهرموني Mirena وتكون الآثار الجانبية قليلة وبسيطة وتزداد نسبة نجاح العلاج مع مرور الزمن .

5) الاضطراب للعمل الجراحي : لقد وجدنا خلال سنة من المتابعة أن :

الجدول رقم (5)

عدد المريضات	استئصال الرحم
11=22%	المجموعة A

المجموعة B	3 = 8.55%
Z	1.67
P	* 0.049

نلاحظ من الجدول رقم (5) لن نسبة الاضطرار للعمل الجراحي (استئصال الرحم) كانت في المجموعة A 22% بينما المجموعة B كانت 8.55% أي أن المجموعة B احتاجت حوالي ثلث مما احتاجته المجموعة A تقريباً للاستئصال الرحمي ونلاحظ إن $P = * 0.049$ أي أن هناك فارق معنوي بمقدار 95% أي أن اللولب الهرموني خفض من نسبة استئصال الرحم مقارنة مع العلاج الفموي وذلك بفارق معنوي جيد (95%). وذلك يؤكد نجاح العلاج باستخدام اللولب الهرموني.

وبدراسة الأسباب الموجبة لإجراء الاستئصال الرحمي عند كلتا المجموعتين وجدنا:
 في المجموعة A أن هناك 5 مريضات (10%) من اللواتي أوقفن العلاج لظهور تأثيرات جانبية للعلاج الفموي اضطررن لإجراء لهن استئصال الرحم، في حين كان هناك 6 مريضات (11%) أخذن العلاج الفموي ست دورات طمئية ولكن لم يتخلصن من النزف الرحم الوظيفي فاضطررن إجراء لهن استئصال رحم.
 في المجموعة B أن هناك 2 مريضتين (5.7%) اضطررنا لسحب اللولب لظهور تأثيرات جانبية اضطررن أيضاً لإجراء لهن استئصال الرحم في حين كان هناك 1 مريضة (2.85%) استخدمت اللولب ولكن النزف الرحمي الوظيفي لم يتحسن فاضطررنا لإجراء لها استئصال رحم.

6 (الدراسات المقارنة) :

هناك العديد من الدراسات والمقالات المنشورة محلياً وعالمياً حول استخدام اللولب الهرموني في تدبير النزف الرحمي الشاذ D.U.B ولكن اعتمدت في دراستي على أخذ دراستين للمقارنة :
 دراسة د. محمد حمدان [9] ودراسة *Dina Monsour [4] فلقد وجدت مايلي :

الجدول رقم (6)

استئصال الرحم	نجاح العلاج	الخضاب بعد سنة	سحب اللولب	
8.55%	88.35%	12 ± 1.3	5.7%	دراستنا مجموعة B
0%	81.39%	12.9±1.7	8.7%	د. محمد حمدان
4.2%	94%	-----	4.3%	Monsour,D*

نلاحظ من الجدول رقم (6) أن معدل الخضاب ارتفع في كل الدراسات المقارنة والنسبة العظمى كانت عند دراسة د. محمد حمدان (ربما يعود سبب ذلك حسب رأي د حمدان هو دراسة الأورام الليفية مع النزف الرحمي الشاذ

حيث أن الأورام الليفية تفرز الأريثروبيوتين وبالتالي ارتفاع الخضاب (؟؟)، وعلى كل حال نلاحظ تحسن الخضاب في كل المجموعات نتيجة التخلص من النزف أطمثي غير الطبيعي بشكل تام أو جزئي بالإضافة إلى دعم المريضة بمركبات الحديد لفترة 3-6 أشهر .

• ونلاحظ أن نسبة نجاح العلاج كانت الأعلى عند دراسة *Monsour,D حيث بلغت 94% ثم دراستنا (88.35%) بينما في دراسة د. محمد حمدان (81.39%) ويعود سبب ارتفاع نسبة النجاح عند *Monsour,D لأن دراسته استمرت 3 سنوات بينما باقي الدراسات استمرت لسنة واحدة فقط .

• نلاحظ أن معدل استئصال الرحم كان معدوماً 0% في دراسة د. محمد حمدان ؟ ربما يعود السبب لاستبعاد وعدم متابعة المريضات اللواتي تم سحب اللولب لهن (8,7%) بينما في دراستنا كان معدل استئصال الرحم في المجموع ب 8.55% في حين أن دراسة *Monsour,D كان معدل استئصال الرحم 4.2% وهي النسبة الأقل (الدراسة استمرت 3 سنوات ولم يتم استبعاد أية مريضة) .

الاستنتاجات والتوصيات :

لقد وجدنا إن التأثير الجانبي الأكثر حدوثاً في المجموعة A هو الانزعاج من تناول الدواء (70%) والحقيقة في أغلب الدراسات تشير أن فقط 23% من المريضات كن غير ممانعات من العلاج الفموي وغير منزعجين في حين شكل الألم الخثلي وألم أسفل البطن 28.85% عن مريضات المجموعة B .

■ اضطررنا لإيقاف العلاج في المجموعة A بنسبة 16% بسبب ظهور تأثير جانبي أو أكثر وخاصة الألم المعدي أو بسبب الانزعاج من تناول الدواء أو بسبب استمرار النزف أو التمشيح في حين في المجموعة B اضطررنا لسحب اللولب 5.7% من الحالات وذلك لظهور تأثير جانبي مثل الألم الخثلي أو أسفل الظهر أو بسبب استمرار النزف والتمشيح .

■ لاحظنا أن الخضاب قد تحسن في كلتا المجموعتين وبعد ذلك بسبب التخلص من النزف أطمثي فبعد 6 أشهر من العلاج في المجموعة A كان متوسط الخضاب 11.7 ± 1.2 بينما المجموعة B كان بعد 6 أشهر 1.4 ± 11.9 غ/دل وبعد سنة كان 12 ± 1.3 غ/دل .

■ نلاحظ من الدراسة أن نسبة نجاح العلاج في المجموعة A بعد 6 أشهر (6 دورات طمثية) كانت 76% في حين في المجموعة B كانت 79.8% وارتفعت إلى 88.35% بعد سنة من تركيب اللولب الهرموني .

■ نلاحظ أن الحاجة لإجراء استئصال الرحم قد انخفضت إلى الثلث تقريباً في المجموعة B عما هو عليه في المجموعة A حيث بلغت نسبة الحاجة لاستئصال الرحم في المجموعة A 22% بينما في المجموعة B 8.55%. وانطلاقاً من المعطيات السابقة فإننا

ننصح ونوصي :

❖ بتطبيق العلاج الهرموني بواسطة اللولب الهرموني داخل الرحم المحرر للليفونورجستريل في حالات النزف الرحمي الوظيفي (D.U.B) حول سن اليأس (الضهي) كخط أول فهو يقلل بشكل ملحوظ التأثيرات الجانبية التي تظهر عند اخذ الدواء فمويًا كما يقلل الحاجة لاستئصال الرحم إلى الثلث [10] حيث ننصح بتطبيق اللولب الهرموني كعلاج لل D.U.B في المؤسسات و المشافي الصحية.

❖ كما نقترح ونوصي بإجراء دراسات مماثلة في المستقبل على أن تكون مدة المتابعة بعد بدء العلاج سنتين أو ثلاث سنوات وذلك للوقوف عن كثب والتأكد أكثر من مدى فاعلية هذه الطريقة في العلاج .

المراجع:

- 1- CAROLYN,B. *Abnormal Uterine Bleeding in Pre-Menopausal Women*. Journal of Obstetrics and Gynecology Canada, vol 35, N.5 May 2013,13-14-15 .
- 2- BAYAR, S; DECHERNY,A. Clinical Manifestations and Treatment of Dysfunctional Uterine Bleeding. JAMA 1993; 269: 1823-28 .
- 3- VUILOS, G; LEFEBVRE, D; GRAVES, N. *The guide for the Management of Abnormal Uterine Bleeding*. The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada, (August 2001)106 .
- 4- MANSOUR,D . *Modern management of abnormal uterine bleeding , the levonorgestrel intra-uterine system*. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynecology London,Vol. 21, No 6, 2007,52-64.
- 5- LAHTEENMKI,S; PUOLAKKA,J.*Open randomized study of use of levonorgestrel releasing intrauterine system as alternative to hysterectomy* . NewYork vol16 ,116:122-2009 .
- 6- RAURAMO, I . *Long-term treatment of menorrhagia with levonorgestrel intrauterine system versus endometrial resection* . Obstet-Gynecl 2004; 104.
- 7- LUKES, A;REARDON,B. *Use of the levonorgestrel – releasing intrauterine system in women with haemostatic disorders* . Fertile Sterile Australia, Vol.90.N.3,2009.
- 8- KOH ,S ; SINGH, K. *The effect of levonorgestrel-releasing intrauterine system use on menstrual blood loss and the haemostatic, fibrinolytic/inhibitor systems in women with menorrhagia* . 2007; 5 133–138 .
- 9- حمدان، محمد. تدبير النزف الرحمي الشاذ لدى مريضات الأورام الليفية الرحمية. مجلة جامعة دمشق للعلوم الصحية في القطر العربي السوري، المجلد السابع والعشرون العدد الأول، 2011، 247،248،249،250.
- 10- DUEHOLM , M . *Levonorgestrel – IUD should be offered before hysterectomy for abnormal uterine bleeding without uterine structural abnormalities*. Acta Obstet Gynecol Scand. 2009;88(12):1302-4.